CHARLOTTE GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY

NuLYTELY
Preparación para la colonoscopia

Paciente _____ **Médico**_____

Ubicación _____ **Hora de la llegada** _____ **a.m. p.m.**

Fecha de la intervención _____

Si normalmente toma los siguientes medicamentos, comuníquese con el médico que se los recetó para asegurarse de que está bien suspenderlos durante la cantidad recomendada de días.* Si su médico le dice que no está bien dejar de tomarlos, comuníquese con nuestro consultorio.

No deje de tomar aspirina durante la intervención.

MEDICAMENTOS:	Días recomendados para dejar de tomarlos antes de la intervención*
• Fentermina	14 días
• Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) • Dulaglutida (Trulicidad) • Inyección de exenatida (Bydureon, Byetta) • Tirzepatida (Mounjaro)	7 días
• Coumadin • Plavix • Effient • Brilinta	5 días
• Xarelto • Eliquis	2 días
• Liraglutida (Victoza, Saxenda) • Exenatida oral (Bydureon, Byetta)	Deje de tomarlo la mañana de

CUATRO (4) DÍAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN:

Deje de comer maíz o tomates, papas fritas, nueces, palomitas de maíz o cualquier fruta o verdura que contenga semillas pequeñas. También evite los comprimidos de hierro (a menos que lo recomiende un médico) y los suplementos a base de aceite (aceite de pescado, etc.).

UN (1) DÍA ANTES DE LA INTERVENCIÓN:

Comience una dieta de líquidos claros todo el día, como caldo o consomé, gelatina (excepto roja o morada), café (negro o con azúcar, pero sin cremas, incluso cremas no lácteas), té, jugo de fruta claro sin pulpa como jugo de uva blanca o manzana y refresco claro (Sprite, 7-Up, Ginger ale, etc.). También puede tomar Gatorade, paletas heladas (excepto rojas o moradas) y limonada sin pulpa. Nada de leche ni productos lácteos. Esto incluye SlimFast, Ensure y tragos proteicos. Asegúrese de beber mucho líquido claro durante todo el día.

LA TARDE ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

4:00 p.m.

Tome 2 comprimidos de Bisacodyl o DULCOLAX (sin receta) con agua.

Elija el sabor de NuLYTELY de su elección. Agregue agua hasta la línea superior del recipiente desechable. Aplique la tapa y agite hasta que se disuelva.

Colóquelo en el refrigerador.

5:00 p.m.

Beba la MITAD de la solución tomando un (1) vaso de 8 onzas cada 15-20 minutos.

8 onzas	5:15-5:20 p.m.	+15-20 min	+15-20 min	+15-20 min	+15-20 min	+15-20 min	+15-20 min	=50 %

LA MAÑANA DE LA INTERVENCIÓN:

***6 horas** antes de la hora de la intervención:* Bebe lo que resta de la solución. ***Dependiendo de la hora de la intervención, puede que tenga que levantarse en mitad de la noche.* 	***4 horas** antes de la intervención:* Se debe completar el último vaso de la solución. ***¡No coma ni beba nada más!*** 	***No se permite el consumo de goma de mascar, mentas, caramelos duros o hielo el día de la intervención.*** Si toma medicamentos para la presión arterial, puede tomarlos la mañana de la intervención con un sorbo de agua.

Una persona mayor de 18 años de edad debe permanecer en el centro durante la intervención y encargarse de su traslado al lugar de la intervención y posteriormente a su casa. De lo contrario, se cancelará su intervención. Si tiene preguntas, llame al 704-377-4009.