



**CHARLOTTE
GASTROENTEROLOGY &
HEPATOLOGY**

14 días antes de la intervención: no tome fentermina.

7 días antes de la intervención: no tome semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), dulaglutida (Trulicity), exenatida inyectable (Bydureon, Byetta) ni tirzepatida (Mounjaro, Zepbound).

5 días antes de la intervención: si corresponde, no tome Coumadin, Plavix, Effient ni Brilinta. Póngase en contacto con el médico que le recetó el medicamento para asegurarse de que esté bien dejar de tomarlo. No deje de tomar aspirina 81 mg para la intervención.

2 días antes de la intervención: si corresponde, deje de tomar Xarelto y Eliquis. Póngase en contacto con el médico que le recetó el medicamento para asegurarse de que esté bien dejar de tomarlo. Luego, comience con una dieta baja en residuos. Esta es una dieta de alimentos blandos, es decir, cualquier cosa que se pueda aplastar fácilmente con los dedos. Debe evitar los alimentos ricos en fibra como las verduras crudas, la carne roja o los alimentos con semillas.

En la mañana de la intervención, deje de tomar liraglutida (Victoza, Saxenda) y exenatida oral (Bydureon, Byetta).

9 a.m.: mezcle una botella de 238 g de Miralax con 64 onzas de Gatorade (ni rojo ni morado).

Mediodía: tome 2 comprimidos de Dulcolax.

2 p.m.: beba un vaso de 8 onzas de preparación cada 15-20 minutos, hasta que quede la mitad de la mezcla.

6 p.m.: beba un vaso de 8 onzas de preparación cada 15-20 minutos, hasta que no quede más mezcla.

En el día antes de la intervención: dieta de líquidos transparentes, proceda con las instrucciones de Suprep adjuntas.

No dude en llamar a nuestro consultorio si tiene alguna pregunta o inquietud.