

Paciente: _____ Médico: _____

Ubicación: _____ Fecha de la intervención: _____ Hora de llegada: _____

Tenga en cuenta lo siguiente: estas instrucciones son *solo* para los pacientes que se someten a una EGD (endoscopia superior).

Si también se va a hacer una colonoscopia, siga las instrucciones de preparación para la colonoscopia en lugar de las siguientes instrucciones.

• Fentermina	14 días
• Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) • Dulaglutida (Trulicid) • Inyección de exenatida (Bydureon, Byetta) • Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound)	7 días
• Coumadin	5 días
• Plavix	
• Effient	
• Brilinta	
• Xarelto	2 días
• Eliquis	
• Liraglutida (Victoza, Saxenda)	Deje de tomarlo la mañana de la intervención
• Exenatida oral (Bydureon, Byetta)	

Si normalmente toma los siguientes medicamentos, comuníquese con el médico que se los recetó para asegurarse de que esté bien suspenderlos durante la cantidad recomendada de días.

***Si su médico le dice que no está bien dejar de tomarlos, comuníquese con nuestro consultorio. No deje de tomar aspirina durante la intervención.**

NO COMA NI BEBA NADA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE DEL DÍA ANTES DE LA INTERVENCIÓN.

EN LA MAÑANA DE SU INTERVENCIÓN, puede tomar pequeños sorbos de agua hasta 2 horas antes de la intervención.

No se permite el consumo de goma de mascar, mentas o caramelos duros el día de la intervención.

Los medicamentos para la presión arterial y el corazón se pueden tomar la mañana del examen con un pequeño sorbo de agua.

Una persona de al menos 18 años de edad debe permanecer en el centro durante la intervención y encargarse de su traslado al lugar de la intervención y posteriormente a su casa. De lo contrario, se cancelará su intervención.

Si tiene preguntas, llame al (704) 377-4009.