



PREPARACIÓN DE MOVIPREP CON DOSIS DIVIDIDA

Paciente: _____ Médico: _____

Hospital: _____ Hora de llegada: _____

Fecha de la intervención: _____

Si toma fentermina, deje de tomarla **14** días antes de la intervención.

Si toma semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), dulaglutida (Trulicity), exenatida inyectable (Bydureon, Byetta) o tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), deje de tomarlo **7** días antes de la intervención.

Si toma Coumadin, Plavix, Effient o Brilinta, deje de tomarlo **5** días antes de la colonoscopia. Si toma Xarelto o Eliquis, deja de tomarlo **2** días antes de la colonoscopia.

Si toma liraglutida (Victoza, Saxenda) o exenatida oral (Bydureon, Byetta), deje de tomarlo la mañana de su intervención.

Si normalmente toma Coumadin, Plavix, Xarelto, Effient, Brilinta o Eliquis, póngase en contacto con el médico que se los recetó para asegurarse de que puede dejar de tomarlos durante la cantidad de días recomendada.

Si su médico le dice que no está bien dejar de tomarlos, comuníquese con nuestro consultorio.

No deje de tomar aspirina durante la intervención.

CUATRO DÍAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN: deje de comer MAÍZ, TOMATE, PAPAS FRITAS, FRUTAS o cualquier fruta o verdura que contenga semillas pequeñas. También evite los COMPRIMIDOS DE HIERRO (a menos que lo recomiende un médico) y los SUPLEMENTOS A BASE DE ACEITE (aceite de pescado, etc.).

UN DÍA ANTES DE LA INTERVENCIÓN: NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO. Es posible que solo tome líquidos claros, como caldo o consomé. Se permite el consumo de gelatina (excepto roja), café (sin cremas, incluso las sin lactosa), té, jugos de frutas claros sin pulpa y refrescos claros. **NADA DE LECHE NI PRODUCTOS LÁCTEOS.**

ESTO INCLUYE SLIM FAST, ENSURE Y BEBIDAS PROTEICAS.

5:00 p.m. Vacíe una bolsa A y una bolsa B en un recipiente desechable. Agregue agua tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle para disolver y refrigérelo.

6:00 p.m. Beba la solución de MoviPrep. El recipiente está dividido por cuatro marcas. Cada quince minutos, beba la solución hasta la siguiente marca hasta que esté vacía. Siga con dos vasos de 8 onzas con agua o jugo claro.

La NOCHE previa a la INTERVENCIÓN: vacíe una bolsa A y una bolsa B en un recipiente desechable. Agregue agua tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle para disolver y refrigérelo.

SEIS HORAS ANTES DE SALIR DE SU CASA: beba la solución de MoviPrep. Cada quince minutos, beba la solución hasta la siguiente marca hasta que esté vacía. Siga con dos vasos de 8 onzas con agua o jugo claro.

NOTA: Asegúrese de completar su régimen de administración recetado según las indicaciones de su médico. Asegúrese de beber mucho líquido. Debe completar todos los pasos.

NO TOME NADA POR VÍA ORAL 4 HORAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN

SI TOMA MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN ARTERIAL, PUEDE TOMARLOS LA MAÑANA DE LA INTERVENCIÓN CON UN PEQUEÑO SORBO DE AGUA.

Si necesita cancelar o reprogramar una intervención en el CONSULTORIO, notifíquenos dentro de los tres días hábiles posteriores a la cancelación, de lo contrario, se cobrará una tarifa de \$100.

Alguien debe permanecer en el centro durante la intervención y encargarse de su traslado al lugar de la intervención y posteriormente a su casa. De lo contrario, se cancelará su intervención.