



Preparación para la colonoscopia con SUTAB

Paciente _____ Médico _____
Ubicación _____ Hora de llegada _____ a.m. p.m.
Fecha de la intervención _____

Siga las instrucciones exactamente como se detallan a continuación.

MEDICAMENTOS:

Si normalmente toma los siguientes medicamentos, comuníquese con el médico que se los recetó para asegurarse de que está bien suspenderlos durante la cantidad recomendada de días.* Si su médico le dice que no está bien dejar de tomarlos, comuníquese con nuestro consultorio.

No deje de tomar aspirina durante la intervención.

Días recomendados para dejar de tomarlos antes de la intervención*

MEDICAMENTOS:

• Fentermina	14 días
• Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) • Dulaglutida (Trulicid) • Inyección de exenatida (Bydureon, Byetta) • Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound)	7 días
• Coumadin • Plavix • Effient	5 días
• Brilinta • Xarelto • Eliquis	2 días
• Liraglutida (Victoza, Saxenda) • Exenatida oral (Bydureon, Byetta)	Deje de tomarlo la mañana de la intervención

CUATRO (4) DÍAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN:

Deje de comer maíz o tomates, papas fritas, nueces, palomitas de maíz o cualquier fruta o verdura que contenga semillas pequeñas. También evite los comprimidos de hierro (a menos que lo recomiende un médico) y los suplementos a base de aceite (aceite de pescado, etc.).

UN (1) DÍA ANTES DE LA INTERVENCIÓN:

Empiece una dieta de líquidos claros durante todo el día, como caldo o consomé, gelatina (excepto roja o morada), café (solo o con azúcar, pero sin cremas, ni siquiera cremas no lácteas), té, **zumo de fruta claro sin pulpa, como zumo de uva blanca o manzana y refrescos claros (Sprite, 7-Up, Ginger ale, etc.**). También puede tomar Gatorade, paletas heladas (excepto rojas o moradas) y limonada sin pulpa. Nada de leche ni productos lácteos. Esto incluye SlimFast, Ensure y tragos proteicos. Asegúrese de beber mucho líquido transparente durante todo el día.

Su médico le recomendó un régimen de **SUTAB** con dosis dividida (dos días). Se necesitan los dos frascos de 12 comprimidos para una preparación completa. La noche previa a la intervención, a las **6:00 p.m.**, complete los pasos 1 a 4 con un (1) frasco de 12 comprimidos.



6:00 p.m.



Paso 1: Abra 1 frasco de comprimidos de **SUTAB**.



Paso 2: Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante 30 a 40 minutos.

Si se siente incómodo, tome los comprimidos y el agua más lentamente.



Aprox. 7:40 p.m.



Paso 3: Aproximadamente 1 hora después de tragar el último comprimido, llene el recipiente provisto por segunda vez con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda la cantidad durante 30 minutos.



Aprox. 8:40 p.m.



Paso 4: Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas (hasta la línea de llenado) y beba toda la cantidad durante 30 minutos.

7 HORAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN: Repita los pasos del 1 al 4 con el otro frasco de 12 comprimidos. Debe terminar de beber el último vaso de agua al menos 4 horas, o según se le indique, antes de la hora de la intervención.

Tenga en cuenta lo siguiente: dependiendo de la hora de su intervención,

NO COMA NI BEBA NADA MÁS DESPUÉS DE TERMINAR EL ÚLTIMO VASO DE AGUA. NO SE PERMITE EL CONSUMO DE GOMA DE MASCAR, MENTAS, CARAMELOS DUROS O HIELO EL DÍA DE LA INTERVENCIÓN.

Si toma medicamentos para la presión arterial, puede tomarlos la mañana de la intervención con un sorbo de agua.

<i>tomar la segunda dosis de SUTAB puede implicar levantarse en medio de la noche.</i>	
--	--

Una persona mayor de 18 años de edad debe permanecer en el centro durante la intervención y encargarse de su traslado al lugar de la intervención y posteriormente a su casa. De lo contrario, se cancelará su intervención. Si tiene preguntas, llame al 704-377-4009.