

AL DÍA SIGUIENTE

Paciente _____ médico _____

Ubicación _____ Fecha _____ Hora del procedimiento _____

hora de llegada _____

Continúe suspendiendo los medicamentos según las indicaciones previas hasta nuevo aviso

Una persona de al menos 18 años debe llevarlo al procedimiento, permanecer en el centro durante su procedimiento y llevarlo a casa después. De lo contrario, su procedimiento será cancelado. Si tiene alguna pregunta, llame al 704-377-4009.

El procedimiento de hoy fue incompleto porque aún había heces en su colon. Necesitará beber una solución laxante adicional para limpiar su colon. Se recomienda que beba toda la solución para una limpieza más efectiva. Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar la preparación.

COMPRE EN CUALQUIER FARMACIA (NO SE REQUIERE RECETA)

- Miralax/Glycolax-one (1) 238-gram bottle
- Gatorade-64 ounces (not red or purple)

Hoy a las 6 p. m.

Vierta el frasco de MiraLAX® y 64 onzas de Gatorade en una jarra grande y mezcle bien hasta que el MiraLAX® esté completamente disuelto. Beba un (1) vaso de 8 onzas cada 10–15 minutos hasta que la MITAD de la mezcla se haya terminado.

Si presenta náusea, reduzca el ritmo de consumo o tome un breve descanso y luego reanude. Es importante continuar bebiendo líquidos claros hasta la hora de acostarse.

6 horas antes de la hora de su procedimiento: Beba la MITAD restante de la solución de preparación hasta que se termine por completo. Esto debe completarse dentro de las 4 horas previas al inicio del procedimiento.

Nota: Dependiendo de la hora de su procedimiento, tomar la segunda dosis de MIRALAX puede implicar levantarse en medio de la noche.

No coma ni beba nada durante las 4 horas previas a la hora de su procedimiento. No use chicle/mentas/caramelos duros/ni chupe hielo el día de su procedimiento.

Si toma medicación para la presión arterial, puede tomarla la mañana de su procedimiento con un pequeño sorbo de agua