

NuLYTELY

Una persona de al menos 18 años o más debe llevarlo a su procedimiento, permanecer en la instalación durante su procedimiento y conducirlo a casa después. De lo contrario, su procedimiento será cancelado. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 704-377-4009. Los tiempos de los procedimientos varían; pueden ocurrir retrasos.

Si normalmente toma los siguientes medicamentos, comuníquese con el médico que los recetó para asegurarse de que esté bien suspenderlos por el número de días recomendados. Si su médico indica que no es seguro suspenderlos, por favor contacte a nuestra oficina. No suspenda la aspirina para el procedimiento.

¡No siga las instrucciones de la caja de SUTAB!**2 días antes del procedimiento**

Phentermine	7 días
GLP-1 agonists (Mounjaro, Zepbound, etc.)	7 días
Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta	5 días
Xarelto & Eliquis	2 días
Medicamentos para la diabetes	Omitir la mañana del procedimiento

Suspenda el consumo de maíz, tomates, papas fritas, nueces, palomitas de maíz, quinoa o cualquier fruta/verdura que contenga semillas pequeñas. También evite las tabletas de hierro (a menos que lo indique un médico) y los suplementos a base de aceite (aceite de pescado, etc.).

Compre (no se requiere receta);

Dulcolax o Bisacodilo –necesitará 2 tabletas

Día antes del procedimiento:

- Comience una dieta de líquidos claros en la mañana: agua, café (negro), té, jugo sin pulpa o refresco claro.
- A las 4 p.m., el día antes de su procedimiento, tome las 2 tabletas de Dulcolax con agua.
- También puede consumir paletas heladas, gelatina, Gatorade y caldo (nada de color rojo o morado).
- No consuma leche ni productos lácteos. Esto incluye SlimFast, Ensure, bebidas de proteína y cremas.
- Asegúrese de beber abundantes líquidos claros durante el día para mantenerse hidratado.

Su médico ha recomendado la limpieza con NuLYTELY la noche antes de su procedimiento a las 6:00 p.m. Toda la preparación es necesaria para una limpieza completa.

Noche antes del procedimiento:

- A las 6 p.m., llene la botella de NuLYTELY hasta la “línea de llenado” y mezcle bien hasta que NuLYTELY esté completamente disuelto. Puede añadir sabores opcionales. La mezcla se sirve mejor fría. Esta preparación se dividirá en dos dosis.
- Beba un vaso de 8 oz cada 15–20 minutos hasta que se termine la primera MITAD de la mezcla (8 vasos).

Si experimenta náusea, hinchazón o cólicos abdominales, reduzca la velocidad o tome un descanso corto de beber (no más de 30 minutos). Comience de nuevo una vez que se sienta mejor y asegúrese de terminar todo el líquido.

Mañana del procedimiento;

- 6 horas antes de la hora del procedimiento, beba la segunda dosis de NuLYTELY. Beba un vaso de 8 oz cada 15–20 minutos hasta que se termine la segunda mitad de la mezcla.
- Si toma medicamentos para la presión arterial, tómelos la mañana de su procedimiento con un sorbo de agua.
- Si toma medicamentos para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento.
- No consuma chicle, mentas, dulces duros ni hielo el día de su procedimiento.
- No use productos de cannabis/THC el día de su procedimiento.
- No beba nada más durante al menos 4 horas antes de la hora de su procedimiento.