

Paciente _____

Doctora _____

Ubicación _____

Fecha del procedimiento: _____

Arrival Time: _____

Tenga en cuenta: Estas instrucciones son para pacientes que se someterán únicamente a una EGD (Endoscopia Superior). Si también se va a realizar una colonoscopia, por favor siga las instrucciones de preparación para la colonoscopia en lugar de las que se indican a continuación.

- Semaglutide - (ozempic, Wegovy, Rybelsus)
- Dulaglutide - (Trulicity)
- Exenatide Injection - (Bydureon, Byetta)
- Tirzepatide - (Mounjaro, Zepbound)
- Phentermine

7 days

- Coumadin
- Plavix
- Effient
- Brilinta

5 days

- Xarelto
- Eliquis

2 days

- Liraglutide - (Victoza, Saxenda)
- Exenatide Oral - (Bydureon, Byetta)

**Deje de tomar
la mañana del
procedimiento**

Si normalmente toma los siguientes medicamentos, comuníquese con el médico que los recetó para asegurarse de que esté bien suspenderlos durante el número de días recomendado.

Si su médico indica que no es recomendable suspenderlos, por favor comuníquese con nuestra oficina. No suspenda la aspirina para el procedimiento.

NO COMA NI BEBA NADA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE LA NOCHE ANTERIOR A SU PROCEDIMIENTO. LA MAÑANA DE SU PROCEDIMIENTO, puede tomar pequeños sorbos de agua hasta 2 horas antes de su procedimiento.

No se permite el uso de chicle, mentas ni caramelos duros el día de su procedimiento.

Los medicamentos para la presión arterial y el corazón pueden tomarse la mañana del examen con un pequeño sorbo de agua.

Una persona de al menos 18 años de edad debe llevarlo al procedimiento, permanecer en el centro durante el procedimiento y llevarlo a casa después. De lo contrario, su procedimiento será cancelado.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al (704) 377-4009.