

Preparación de dos días con líquidos claros

Paciente _____

Doctora _____

Ubicación _____

Fecha del procedimiento: _____

Arrival Time: _____

- | | |
|---|----------------------|
| • Semaglutide - (ozempic, Wegovy, Rybelsus) | |
| • Dulaglutide - (Trulicity) | |
| • Exenatide Injection - (Bydureon, Byetta) | 7 días |
| • Tirzepatide - (Mounjaro, Zepbound) | |
| • Phentermine | |
| | |
| • Coumadin | |
| • Plavix | |
| • Effient | 5 días |
| • Brilinta | |
| | |
| • Xarelto | 2 días |
| • Eliquis | |
| | |
| • Liraglutide - (Victoza, Saxenda) | Deje de tomar |
| • Exenatide Oral - (Bydureon, Byetta) | la mañana de |

Dos días antes del procedimiento: Al despertar, no consuma alimentos sólidos. Solo dieta de líquidos claros. Puede incluir: caldo, gelatina (sin color rojo o morado), café o té (se permite endulzante, pero sin leche), paletas de hielo, y jugos claros sin pulpa.

A las 6 p. m.: Beba una (1) botella de 10 oz de Citrato de Magnesio.

Continúe con la dieta de líquidos claros.

Día antes del procedimiento: Continúe con la dieta de líquidos claros. Siga las instrucciones de preparación que se le dieron en la hoja de preparación.