

¡No siga las instrucciones de la caja de SUTAB!

******Una persona de al menos 18 años debe llevarlo al procedimiento, permanecer en el centro durante su procedimiento y llevarlo a casa después. De lo contrario, su procedimiento será cancelado. Si tiene alguna pregunta, llame al 704-377-4009. Los horarios de los procedimientos pueden variar; pueden ocurrir retrasos.

Si normalmente toma los siguientes medicamentos, comuníquese con el médico que se los recetó para asegurarse de que es seguro suspenderlos durante el número de días recomendado. Si su médico le indica que no es seguro suspenderlos, comuníquese con nuestra oficina. No suspenda la aspirina para el procedimiento.

¡No siga las instrucciones de la caja de SUTAB!**2 días antes del procedimiento**

Phentermine	7 días
GLP-1 agonists	
Mounjaro, Zepbound, etc.)	7 días
Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta	5 días
Xarelto & Eliquis	2 días
Medicamentos para la diabetes	Omitir la mañana del procedimiento

Deje de consumir maíz, tomates, papas fritas, nueces, palomitas de maíz, quinoa o cualquier fruta/verdura con semillas pequeñas. También evite tabletas de hierro (a menos que su médico le indique lo contrario) y suplementos a base de aceite (aceite de pescado, etc.).

Día antes del procedimiento:

- Comience una dieta de líquidos claros en la mañana: agua, café negro, té, jugo sin pulpa o refresco claro.
- También puede consumir paletas heladas, gelatina, Gatorade y caldo (nada rojo ni morado).
- No consuma leche ni productos lácteos. Esto incluye SlimFast, Ensure, bebidas de proteína y cremas.
- Asegúrese de beber abundantes líquidos claros durante el día para mantenerse hidratado.

Su médico ha recomendado la limpieza con SUTAB. Se requieren ambos frascos de tabletas (24 tabletas) para una preparación completa. La noche anterior a su procedimiento, a las 6:00 p. m., complete los pasos 1 al 4 (que aparecen a continuación).

La noche antes del procedimiento:

- Paso 1: Abra el primer frasco de SUTAB (12 tabletas). Llene el recipiente provisto con 16 oz (aprox. 473 ml) de agua (hasta la línea de llenado).
- Paso 2: Trague cada tableta con un sorbo de agua y beba la cantidad total en 30–40 minutos.
- Paso 3: Aproximadamente 1 hora después de tragar la última tableta, vuelva a llenar el recipiente con 16 oz (aprox. 473 ml) de agua y beba toda la cantidad en 30 minutos.
- Paso 4: Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, beba otras 16 oz (aprox. 473 ml) de agua.

Si presenta náusea, distensión o calambres abdominales, reduzca la velocidad o tome un breve descanso para beber (no más de 30 minutos). Reanude cuando se sienta mejor y asegúrese de terminar todo el líquido dentro del tiempo indicado.

La mañana de su procedimiento

- 6 horas antes de la hora de su procedimiento, repita los pasos 1 al 4 usando el segundo frasco de SUTAB (12 tabletas).
- Si toma medicación para la presión arterial, tómela la mañana de su procedimiento con un pequeño sorbo de agua.
- Si toma medicación para la diabetes, omítala la mañana del procedimiento.
- No use chicle/mentas/caramelos duros/ni chupe hielo el día del procedimiento.
- No consuma cannabis/productos con THC el día del procedimiento.
- No beba nada más durante al menos 4 horas antes de la hora programada de su procedimiento